

Epidemiologie – Protokoll

Adressete des aufgenommenen Patienten mit Symptomen / Verdacht auf Infektionserkrankung nach **IfSG**

(Hierdurch wird nicht die Meldepflicht nach IfSG erledigt, die den lfd. Arzt betrifft!)

► Meldung bitte an Klinikhygiene (Rufgerät oder Mobilfunk über Pforte)

Diagnose / Verdachtssymptome: Neugeborenes mit Cytomegalie-Virus

Erreger / Infektiöses Material: Virus aus der Gruppe der Herpesviren; CMV gelangt über Schleimhautkontakt oder parenteral in den Körper (nosokomial: Urin, respiratorische Sekrete); Übertragung durch Kontakt

Erstinfektion erfolgt meist inapparent (Kindheit, Pubertät), Reaktivierung kann asymptomatisch verlaufen, aber auch mit Symptomen (meist harmlos: fieberhafte Erkrankung, leichte Hepatitis).

Empfohlene Schutzmaßnahmen entsprechend folgender Literatur: Kappstein I. Nosokomiale Infektionen. Zuckschwerdt München 2004; Sitzmann F. Hygiene. Springer Berlin 1999; Sitzmann, F. Hygiene daheim. Huber Bern 2007

- **Mehrbettzimmer** ist möglich
- **Händedesinfektion** vor und nach dem Patientenkontakt bzw. Betreten des Zimmers
- **Schutzkittel** tragen und täglich / pro Dienstsicht erneuern (auch für begleitende Eltern)
 - bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten / Ausscheidungen / Sekreten / Betten des Patienten / Kontakt mit kontaminierten Körperarealen
- Schutzkittel im Patientenzimmer (Außenseite außen) □ außerhalb Patientenzimmer aufhängen
- **Einmalhandschuhe** (bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten / Ausscheidungen / Sekreten / bei Kontakt mit kontaminierten Körperarealen)
- **Mund-Nasenschutz** erforderlich: bei endotrachealer Absaugung
- **Wäscheabwurf** im Zimmer in Textilsack (keine Infektionswäsche)
- **Speisereste** mit **Essgeschirr** zurück in die Spülküche
- **Flächen** (von Fußböden, Möbel, Leisten, Nachtschränke, Bettgestelle u.a.) und **Gegenstände** (Bücher, Spielzeug u.a.) werden **gereinigt**
- **Sichtbare Verunreinigungen** (Kontaminationen durch Ausscheidungen / Sekreten / Blut) müssen **sofort desinfizierend** gereinigt werden
- **Desinfektion** nach Benutzung der Pflege- / Behandlungs- und Untersuchungsmaterialien (Steckbecken, Urinflaschen, Thermometer, Nagelschere, Haarbürste)
- **Keine Schlussdesinfektion** als Wischdesinfektion erforderlich

Alle Flächendesinfektionsarbeiten mit PERFORM 0,5% = 1 Std. Wert oder Alkohol 70 % und Handschuhen ausführen. Beachten Sie auch bitte:

Schwangere sollen keinen Kontakt mit infizierten Patienten haben (bitte auch an schwangere Begleitmütter denken).

Datum: Unterschrift: Franz Sitzmann
12/92, revidiert 10/93, 7/94, 2/97, 10/00; 6/07; Klinikhygiene Mitarbeiter Pflege
Kopie: Patientenakte / Akte Hygienekommission