

Epidemiologie – Protokoll

Adressete des aufgenommenen Patienten mit Symptomen / Verdacht auf Infektionserkrankung nach **IfSG**

(Hierdurch wird nicht die Meldepflicht nach IfSG erledigt, die den lfd. Arzt betrifft!)

► Meldung bitte an Klinikhygiene

Diagnose / Verdachtssymptome: Staphylodermie des Neugeborenen

Erreger / Infektiöses Material: Staphylokokken, Wundsekret

Übertragung erfolgt durch Kontakt: Hände, Hände, Hände und kontaminierte Pflegeartikel

Empfohlene Schutzmaßnahmen entsprechend folgender Literatur: Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention BGA 5/94, Benz et al. Handbuch der Infektionskrankheiten für den stationären Alltag. Bremen; Daschner F. Praktische Krankenhaushygiene und Umweltschutz. Springer Berlin 1997; Kappstein I. Nosokomiale Infektionen. Medco München 2000; Mims et al. Medizinische Mikrobiologie. Ullstein-Mosby Wiesbaden 1996; Sitzmann F. Hygiene. Springer Berlin 1999

X **Einzelzimmer** (Zimmer kennzeichnen, Besucher müssen sich bei Pflegenden anmelden, bitte einweisen oder ausnahmsweise strikte Trennung durch Schutzkittel zwischen jedem Kind)

X Sehr sorgfältige **Händedesinfektion** vor und nach dem Patientenkontakt bzw. Betreten des Zimmers

X **Mütter in die hygienische Händedesinfektion** einweisen

X **Schürze bei jedem kontaminierten/infizierten Kind** tragen und täglich erneuern

X bei Kontakt mit dem Kind (Körperflüssigkeiten / Ausscheidungen / Sekreten / Betten des Patienten / Kontakt mit kontaminierten Körperarealen)

X Schürze im Patientenzimmer kindbezogen aufhängen oder ablegen

X **Einmalhandschuhe** (bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten / Ausscheidungen / Sekreten / bei Kontakt mit infizierten Körperarealen)

X **Sichtbare Verunreinigungen** (Kontaminationen durch Ausscheidungen / Sekreten / Blut) müssen **sofort desinfizierend** gereinigt werden

X **Desinfektion** nach Benutzung der Pflege- / Behandlungs- und Untersuchungsmaterialien (Steckbecken, Urinflaschen, Thermometer, Nagelschere, Haarbürste)

X **Tägliche Desinfektion der Flächen** (Fußboden, patientennahe Flächen)

X **Schlussdesinfektion als Wischdesinfektion nach Entlassung eines infizierten Kindes** durchführen

Alle Flächendesinfektionsarbeiten mit Perform 0,5% = 1 Std. Wert und Handschuhen oder Alkohol 70% ausführen. Beachten Sie auch bitte die folgenden **Anlagen**:

Datum: Unterschrift: Franz Sitzmann

12/92, revidiert 10/93, 7/94, 2/97, 10/00 ; 1/02; 3/11

Klinikhygiene

Mitarbeiter Pflege

Kopie: Patientenakte / Akte Hygienekommission