

## Epidemiologie – Protokoll

**Adressete** des aufgenommenen Patienten mit Symptomen / Verdacht auf Infektionserkrankung nach **IfSG**

(Hierdurch wird nicht die Meldepflicht nach IfSG erledigt, die den lfd. Arzt betrifft!)

► Meldung bitte an Klinikhygiene

**Diagnose / Verdachtssymptome:** Masern (Erwachsene)

**Erreger / Infektiöses Material:** respiratorische Sekrete; aerogen

**Empfohlene Schutzmaßnahmen** entsprechend folgender Literatur: Daschner, F. et al. Praktische Krankenhaushygiene und Umweltschutz. 3. Aufl. Springer Berlin 2006; Kappstein I. Nosokomiale Infektionen, 3. Aufl. Zuckschwert München 2004; Mims et al. Medizinische Mikrobiologie. Ullstein-Mosby Wiesbaden 1996; Sitzmann F. Hygiene. Springer Berlin 1999

- x **Einzelzimmer** (Zimmer kennzeichnen, Besucher müssen sich bei Pflegenden anmelden, bitte einweisen) mit Kind
- x **Händedesinfektion** vor und nach dem Patientenkontakt bzw. Betreten des Zimmers: **sehr sorgfältig praktizieren**
- x **Eigenes WC** oder Nachstuhl zuweisen
- x **Schutzkittel** /Schürze tragen und täglich wechseln
  - x bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten / Ausscheidungen / Sekreten / Betten des Patienten / Kontakt mit kontaminierten Körperarealen
- x Schutzkittel / Schürze im Patientenzimmer (Außenseite außen) aufhängen
- x **Einmalhandschuhe** (bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten / Ausscheidungen / Sekreten / bei Kontakt mit kontaminierten Körperarealen)
- x **Mund-Nasenschutz** wird von immunen Mitarbeitern bei Pflege + Therapie nicht benötigt; nicht immune Mitarbeiter sollen diese Patienten nicht betreuen
- x **Speisereste** mit **Essgeschirr** zurück in die Spülküche
- x **Flächen** (von Fußböden, Möbel, Leisten, Nachtschränke, Bettgestelle u.a.) und **Gegenstände** (Bücher, Spielzeug u.a.) werden **gereinigt**
- x **Sichtbare Verunreinigungen** (Kontaminationen durch Ausscheidungen / Sekreten / Blut) müssen **sofort desinfizierend** gereinigt werden
- x **Desinfektion** nach Benutzung der Pflege- / Behandlungs- und Untersuchungsmaterialien (Steckbecken, Urinflaschen, Thermometer, Nagelschere, Haarbürste)
- x **Tägliche Desinfektion der patientennahen Flächen**
- X **Dauer der speziellen Maßnahmen:** bis 4 Tage nach Exanthembeginn, bei immunsupprimierten Patienten während der gesamten Krankheitsdauer

Alle Flächendesinfektionsarbeiten mit Terralin protect 0,5% = 1 Std. Wert und Handschuhen ausführen.

Anlage: RKI – Ratgeber für Infektionskrankheiten (8/2010)

Datum: ..... Unterschrift: .....Franz Sitzmann .....  
12/92, revidiert 10/93, 7/94, 2/97, 10/00 ; 5/02; 3/03; 7/06; 1/2007; 12/2010 Klinikhygiene Mitarbeiter Pflege  
Kopie: Patientenakte / Akte Hygienekommission