

Epidemiologie – Protokoll

Adressete des aufgenommenen Patienten mit Symptomen / Verdacht auf Infektionserkrankung nach **IfSG**

(Hierdurch wird nicht die Meldepflicht nach IfSG erledigt, die den lfd. Arzt betrifft!)

► Meldung bitte an Klinikhygiene

Verdachtssymptome: Poliomyelitische Lähmungen

Erreger / Infektiöses Material: Stuhl, respiratorisches Sekret

Empfohlene Schutzmaßnahmen entsprechend folgender Literatur: Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention BGA 5/94, Benz et al. Handbuch der Infektionskrankheiten für den stationären Alltag. Bremen; Daschner F. Praktische Krankenhaushygiene und Umweltschutz. Springer Berlin 1997; Kappstein I. Nosokomiale Infektionen. Zuckschwerdt München 2002; Mims et al. Medizinische Mikrobiologie. Ullstein-Mosby Wiesbaden 1996; Sitzmann F. Hygiene. Springer Berlin 1999

X **Einzelzimmer** (Zimmer kennzeichnen, Besucher müssen sich bei Pflegenden anmelden, bitte einweisen)

x **Händedesinfektion** vor und nach dem Patientenkontakt bzw. Betreten des Zimmers

x **Eigenes WC** oder Nachstuhl zuweisen, täglich ist desinfizierende Reinigung erforderlich

X **Schutzkittel** tragen und täglich / pro Dienstschicht erneuern

X nicht bei Betreten des Patientenzimmers

X bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten / Ausscheidungen / Sekreten / Betten des Patienten / Kontakt mit kontaminierten Körperarealen

X Schutzkittel im Patientenzimmer (Außenseite außen) □ außerhalb Patientenzimmer aufhängen

X **Einmalhandschuhe** (bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten / Ausscheidungen / Sekreten / bei Kontakt mit kontaminierten Körperarealen)

X **Mund-Nasenschutz** erforderlich: bei nahem Kontakt

X **Wäscheabwurf** (übliche Form)

X **Müllabwurf** (übliche Form)

X **Speisereste** mit **Essgeschirr** zurück in die Spülküche

X **Sichtbare Verunreinigungen** (Kontaminationen durch Ausscheidungen / Sekreten / Blut) müssen **sofort desinfizierend** gereinigt werden

X **Desinfektion** nach Benutzung der Pflege- / Behandlungs- und Untersuchungsmaterialien (Steckbecken, Urinflaschen, Thermometer, Nagelschere, Haarbürste)

X **Tägliche Desinfektion der Flächen** (Fußboden, patientennahe Flächen)

X **Schlussdesinfektion als Scheuer – Wischdesinfektion** durchführen

Standardhygiene, kein Risiko ohne Kontakt mit Stuhl und respiratorischem Sekret

Alle Flächendesinfektionsarbeiten mit Terralin protect 0,5% = 1 Std. Wert und Handschuhen ausführen.

Beachten Sie auch bitte: **Meldepflicht § 6 IfSG** (Arzt) Verdacht, Erkrankung, Tod (Verdacht = jede schlaffe Lähmung, wenn nicht traumatisch bedingt!)

Datum: 19.8.2002..... Unterschrift: Franz Sitzmann
12/92, revidiert 10/93, 7/94, 2/97, 10/00; 12/10 Klinikhygiene Mitarbeiter Pflege
Kopie: Patientenakte / Akte Hygienekommission