

**Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe: Reinigungs- und Desinfektionsplan Geburtsstation / Kreissaal**

	<b>Wer?</b>	<b>Wie oft?</b>	<b>Was wird genommen?</b>
Händereinigung	Alle Mitarbeiter	Bei Betreten bzw. Verlassen des Arbeitsbereiches, vor und nach Kontakt mit Mutter und Kind	Flüssigseife aus Spender, Seife gründlich abspülen, sorgfältig abtrocknen, Hautpflege beachten!
Hygienische Händedesinfektion	Alle Mitarbeiter	Beispiele: <b>vor</b> Verbandwechsel, Vorbereiten von Injektionen /Infusionen, vor Injektionen, Blutentnahmen, Anlagen von Blasen- und Venenkathetern <b>nach</b> Kontamination <sup>1</sup> (bei grober Verschmutzung vorher diese mit desinfektionsmittelgetränktem Papiertuch vorsichtig entfernen, Hände waschen, anschl. Desinfektion), nach dem Ausziehen der Handschuhe	Alkoholisches Einreibepreparat  Ausreichende Menge entnehmen, damit die Hände vollständig benetzt sind, verreiben bis Hände trocken sind.  <b>kein Wasser zugeben!</b>
Hautantiseptik der Mutter	Pfleger, Ärzte, MTA	Vor Gefäßpunktionen (Injektionen, Blutentnahmen)	Alkohol. Hautantiseptikum und sterilisierter, keimarmer Tupfer: Sprühen - wischen - sprühen – wischen; <i>Einwirkdauer: 30 Sekunden</i>
		Vor Eingriffen mit besonderer Infektionsgefährdung: i.m. – Injektionen, zentrale Venenkatheter, Lumbalpunktion u.a., operativer Schnittentbindung	Octeniderm und sterile Tupfer, mehrmals auftragen Alkohol. PVP-Iod-Präparat und sterile Tupfer, mehrmals auftragen <i>Einwirkdauer: 1 min</i>
		Wunden, bei Verbandwechsel (Indikation beachten!), Schleimhautantiseptik (z.B. Blasenkatheterismus)	Schleimhautantiseptikum <i>Einwirkdauer: 1 Minuten bei Schleimhautantiseptik</i>
Instrumente mit Container	Pfleger	Sofort nach Benutzung	Trockenablage, Weitergabe an Zentralsterilisation zur Aufbereitung
Thermometer	Pfleger	Nach Benutzung (rektale Messung nur mit Einmalhülle)	abwischen mit 70% Alkohol (Propanol)
Blutdruckmanschette	Pfleger, Ärzte	Nach Kontamination	abwischen mit Flächendesinfektionsmittel, trocknen oder mit 70% Alkohol (verdunstet leicht)
Stethoskop	Pfleger, Ärzte	Bei Bedarf	abwischen mit 70% Alkohol einschl. Ohrolive
Nachtschrank	Reinigungsdienst	1mal täglich	Umweltfreundlicher Reiniger, frischer Lappen (blau)
		1mal täglich bei infektiösen Patienten (septisch oder bei meldepflichtigen Erkrankungen)	Flächendesinfektionsmittel 0,5%, frischer Lappen (blau)
Arbeitsflächen zur Injektions-Vorbereitung	Jeder Mitarbeiter	Vor dem Aufziehen von Injektionen und Vorbereiten von Infusionen	Alkohol 70% mit frischem Lappen oder Einmaltuch aufbringen
Kanülen	Pfleger, Ärzte	Direkt nach Gebrauch (bei Kanülen), kein Recapping	Durchstichfeste Kanülensammler
Rasierer, Haarschneidemaschine	Pfleger	Nach Gebrauch	mit Alkohol 70% abwischen Scherkopf in 70% Alkohol eintauchen, trocknen lassen

	Wer?	Wie oft?	Was wird genommen?
Steckbecken, Urinflaschen	Pflegende	Nach jeder Benutzung	Thermisch desinfizierender Steckbeckenspülautomat
Waschschüsseln und Nierenschalen	Pflegende, Rein.dienst	Nach jeder Benutzung auswischen mit Flächendesinfektionsmittel	und frischen Lappen (gelb), ca. 15 Min. einwirken lassen, mit klarem Wasser nachspülen, trocken aufbewahren
Sauerstoffanfeuchtung	Pflegende	Steriles geschlossenes System (auch bei Patientenwechsel > 3 Monate an Sauerstoffspender belassen), Nasensonde jeweils neu	Bei Nichtgebrauch angebrochener Flaschen: neue Sonde und Verbindungsschlauch <i>mit Verpackung</i> an Flasche anschließen
Absaugereinheit	Pflegende	Täglich Sekretaufangflasche, Schlauchsystem und Finger-tip wechseln und in Instrumentendesinfektion einlegen	Spülköcher: in Leitungswasser Zusatz von wässrigem PVP-Iod im Verhältnis 1%
Entbindungsbetten	Reinigungs-dienst	Nach Belegung	Flächendesinfektionsmittel PERFORM 0,5%, frischer Lappen (blau), Matratzenschonbezug und Bettgestell abwischen
Waschbecken, Dusche, Entspannungswanne	Reinigungs-dienst	1mal täglich	Umweltfreundlicher Reiniger, frischer Lappen (gelb)
		Nach jeder Benutzung	Auswischen mit Flächendesinfektionsmittel (PERFORM 0,5%) und frischen Lappen (gelb), ca. 15 Min. einwirken lassen, mit klarem Wasser nachspülen
Duschköpfe		Bei Verkalkung	Reinigen durch kalklösende Lösung
Fußboden		Routine 1mal täglich	Umweltfreundlicher Reiniger, frischer Mopp
	jeder Mitarbeiter	Nach Entbindung	Flächendesinfektionsmittel (PERFORM 0,5%)
		Sofort nach jeder Kontamination mit potentiell infektiösem Material (z.B. Urin, Stuhl, Blut)	Flächendesinfektionsmittel (PERFORM 0,5%)
WC	Reinigungs-dienst	1mal täglich und nach Kontamination	Flächendesinfektionsmittel (PERFORM 0,5%), frischer Lappen (rot)
Geräte, Mobiliar, einschl. Wickeltisch		1mal täglich	umweltfreundlicher Reiniger, frischer Lappen (blau)
		1mal täglich bei infektiösen Patienten (HIV, HBV, HCV oder bei meldepflichtigen Erkrankungen)	Flächendesinfektionsmittel (PERFORM 0,5%), frischer Lappen (blau)
		jeder Mitarbeiter	Sofort nach jeder Kontamination mit potentiell infektiösem Material (z.B. Urin, Stuhl, Blut)

Im übrigen wird auf das als **Hygieneplan geltende** und auf **Station vorliegende Buch**: Sitzmann, F: Hygiene. Springer Berlin 1999 verwiesen.

<sup>1</sup> Kontamination heißt Kontakt mit (möglichem) infektiösem Material. **Beachte:** Bei jeder **Anwendung** von Desinfektionslösungen Schutzhandschuhe tragen. Lösungen nur kalt ansetzen. Erforderliche Desinfektionsarbeiten (z.B. bei septischen Patienten oder infektiösen Patienten) bei der Leitung des Reinigungsdienstes (Rufgerät 322 oder 270) anmelden. Jede Reinemachefrau führt auf ihrem Reinigungswagen ein Zimmerverzeichnis mit notwendigen Desinfektionsarbeiten.